



ЕПІЛЕПСІЯ



ЕПІЛЕПСІЯ — **ГЕТЕРОГЕННА** **ГРУПА**
ЗАХВОРЮВАНЬ, **ЯКІ** **ХАРАКТЕРИЗУЮТЬСЯ**
ПОВТОРНИМИ, **СПОНТАННО** **ВИНИКАЮЧИМИ**
НАПАДАМИ.

ЕПІЛЕПТИЧНИЙ НАПАД **Є** **ОСНОВНИМ СИМПТОМОМ**
ЕПІЛЕПСІЇ **І** **КЛІНІЧНИМ** **ПРОЯВОМ**
ГІПЕРСИНХРОННИХ **РОЗРЯДІВ** **У** **НЕЙРОНАХ**
ГОЛОВНОГО МОЗКУ

КЛАСИФІКАЦІЯ НАПАДІВ ЕПІЛЕПСІЇ

Відповідно до міжнародної класифікації епілептичних нападів виділяють

- Прості (без порушень свідомості) – з моторним, соматосенсорними, вегетативними і психічного симптомами
- Складні – супроводжуються порушенням свідомості
- Первинно-генералізовані напади – з залученням в патологічний процес обох півкуль мозку
- Некласифіковані епілептичні напади – не підходящі ні під один з вищеописаних видів нападів, а також деякі неонатальні напади (жувальні руху, ритмічні рухи очей)
- Повторний епілептичні напади (провоковані, циклічні, випадкові)
- Тривалі напади (епілептичних статус)

КЛІНІКА ЕПІЛЕПТИЧНОЇ ХВОРОБИ

Перша фаза нападу – аура зустрічається приблизно в половині випадків, і іноді цей стан не забувається хворими й вони надалі можуть відтворювати її

Виділяють кілька варіантів аур:

- **сенсорна** - гострий страх, зорові галюцинації у вигляді яскравих неоформлених бачень, тактильні й смакові відчуття, голосні звуки
- **вегетативна** - посилення серцебиття, ядуха, болючі відчуття в грудях і животі, рясний піт
- **моторна** – несподіваний біг, обертання навколо осі тіла, топтання на одному місці
- **психічна** - гостра депресія або відчуття блаженства, слухові уривчасті галюцинації, зміни навколишнього середовища

Друга фаза - тонічна: хворий падає, м'язи тіла різко напружені, голова закинута, від різкого скорочення м'язів голосових зв'язок і м'язів грудної клітки хворий видає різкий звук, можливе мимовільне сечовипускання й дефекація. Свідомість глибоко потьмарена - зіниці не реагують на світло, відсутні больова й тактильна чутливість.

Третя фаза - клонічна: безладне скорочення м'язів тіла, хворий звивається в судомах, на губах піна, через прикус язика й щік нерідко забарвлена кров'ю.

Четверта фаза - відновлюється ритмічне дихання і серцебиття. Однак свідомість глибоко потьмарена, можливий тривалий сон або стан психомоторного порушення, з безцільною агресією, метанням, прагненням кудись піти. Загальна тривалість нападу, включаючи й ауру, декілька хвилин. Хворі після нападу протягом доби, а іноді й більше відчувають слабкість, розбитість, пригніченість настрою. **Напад амнезується.**

ЕПІЛЕПТИЧНИЙ СТАТУС - НЕВІДКЛАДНИЙ
СТАН, ПРИ ЯКОМУ СУДОМНІ НАПАДИ ЙДУТЬ ОДИН ЗА ОДНИМ
НАСТІЛЬКИ ЧАСТО, ЩО У ПРОМІЖКАХ МІЖ НИМИ У ХВОРОГО НЕ
ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ СВІДОМІСТЬ (НА ВІДМІНУ ВІД СЕРІЇ НАПАДІВ),
АБО ЯКЩО ОДИНИЧНИЙ НАПАД ТРИВАЄ ПОНАД 30 ХВИЛИН

ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЇ

Всі методи лікування епілепсії направлені на припинення нападів, поліпшення якості життя і припинення прийому лікарських засобів (на стадії ремісії)

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!